徐氏醫學十六種

5

E Chinese

Vol. V.

5

序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辯其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病證異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法卽或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外臺千金不過裒集古方未能原本內經精通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓籠統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至

於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異訣擇其義有可推試多獲效者附焉庶幾古聖治病之法尚可復覩使學者有所持循不至徬徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派擬其精華摘其繆誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月洄溪徐靈胎書於吳山之半松書屋

凡例

一每病先敘病原首內經次金匱傷寒次病源千金外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中爲病不一則即詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也但載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祗載方名并治法註云見某病門以便翻閱

一專治一病爲主方如一方而所治之病甚多者則爲通治之方先立通治方一卷以俟隨證揀用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以爲準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之祕傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如治骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至于大藥重

劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之痱證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心況疾病乃身命所關豈可輕以諉人此集溯本窮流簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺軌範總目


蘭臺軌範目錄

卷一

卷三

卷四

卷八



蘭臺軌範卷一

吴江徐靈胎洄溪著

通治方雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也

小建中湯金匱 虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝去皮三兩 甘草炙三兩 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑三兩 膠飴一升 右六味以水七升煮取三升去滓納膠飴更上微火消解溫服一升日三服此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸醫誤用害人甚多此咽乾口燥乃津液少非有火也

黄耆建中湯金匱 虛勞裏急諸不足者主之 於小建中湯內加黄耆一兩半餘依前法

大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩寃酸痛不能久立

黄耆 當歸 桂心 芍藥 人參 甘草各一錢 半夏炮 黑附子炮各二錢半 右藥每服五錢加薑三片棗二枚煎服此非金匱大建中湯金匱方入腹痛門桂枝去皮即桂心非近時所用之肉桂心也此方兼治下焦虛寒之症不但建立中宮

炙甘草湯傷寒論一名復脉湯 治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草炙四兩 桂枝 生薑各三兩 麥門冬半斤 麻仁半斤 阿膠 人參各二兩 大棗三十枚 生地黄一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠消盡溫服一升日三服此治血脉空竭方用酒所以和血脉凡脉見結悸者雖行動如常亦不出百日必死若復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黄丸崔氏 虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黄八兩九蒸為度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 桂枝 附子各一兩

右八味為末。煉蜜丸如桐子大。酒下十五丸。日再服。此方亦治脚氣乃驅邪水以益正水之法也此方專利小便水去而陰不傷扶陽而火不升製方之妙固非一端但近人以此一方治天下之病則又大失此方之義也

資生腎氣丸 治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。或肚腹腫脹。四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蠱證。於前八味丸加車前子、牛膝各一兩。餘依前法。

六味地黃丸錢氏 治腎陰不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暈。眼花耳聾。咽乾舌痛。齒牙不固。腰腿痿軟。自汗盜汗。便血諸血。失音。水泛為痰。血虛發熱等證。於前方去肉桂、附子。餘依前法。此方錢氏專治小兒

當歸生薑羊肉湯金匱 治產後腹中㽲痛。並治腹中寒疝。虛勞不足。

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤 右以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。如加生薑等者。亦加水五升。煮取三升二合服之。精不足者補之以味此方是也

竹葉石膏湯傷寒論 治傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。

竹葉二把 石膏一斤碎 半夏半斤洗 人參三兩 甘草二兩炙 麥門冬一升去心 粳米半升 右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。納粳米。煮米熟湯成。去米。溫服一升。日三服。集驗載此方加生薑治嘔最良此治三陽餘熱未盡凡大病之後必有留熱總宜清解後人俱概用峻補以留其邪則元氣不能驟復愈補愈虛矣亦治傷暑發渴脈虛。暑病有虛熱者宜之若吐逆霍亂之症則大誤矣

脾約丸金匱即麻仁丸 治腸胃熱燥。大便祕結。

麻仁五兩另研 大黃一斤蒸焙 厚朴薑炒 枳實麩炒 芍藥炒各五兩 杏仁五兩半 右為末。蜜丸梧子大。臨睡用白湯送下二十丸。大便利即止。此潤腸之主方

四君子湯 治面色痿白。言語輕微。四肢無力。脈來虛弱者。若內傷虛熱。或飲食難化。須加炮薑。

人參　白朮　茯苓　甘草各二錢　右加薑棗水煎服此補脾之主方

五味異功散錢氏　調理脾胃。於四君子湯加陳皮一錢為末每服二錢白湯調服

七味白朮散　治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦　於四君子湯加藿香半兩葛根一兩木香二錢半為末每服二錢白湯調下

六君子湯　治氣虛有痰脾虛臌脹　即前方加陳皮半夏餘依前法更加藿香砂仁為香砂六君子湯

獨參湯　治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參分兩隨人隨症　右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減此一時急救之法服後即當隨症用藥

參附湯　治陰陽血氣暴脫證

人參一兩　附子製五錢　右加薑棗水煎服此亦急救之方本方去人參加黃耆名耆附湯

保元湯

黃耆三錢　人參二錢　甘草一錢　肉桂春夏二三分秋冬六七分　右四味水煎服氣血虛寒者用之純虛寒之症症亦用此乃宋以後之方故肉桂止用二三分以為氣分引藥乃厚桂非桂枝也

生脈飲醫錄　治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參五錢　麥門冬　五味子各三錢　右三味水煎服此方傷暑之後存其津液庸醫即以之治暑病誤甚觀方下治證並無一字治暑邪者此即於復脈湯內取參麥二味以止汗故復加五味子近人不論何病每用此方收住邪氣殺人無算

歸脾湯濟生　治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參　龍眼肉　黃耆各二錢半　甘草五分　白朮二錢半　茯苓二錢半　木香五分　當歸　酸棗仁炒研　遠志各一錢　右加薑三片水煎服補脾有二法一補心以生脾血一補腎以壯脾氣此方乃心脾同治之法補後天以生血即所以調經

補中益氣湯(東垣) 治陰虛內熱。頭痛口渴。表熱自汗。不任風寒。脈洪大。心煩不安。四肢困倦。懶於言語。無
氣以動。動則氣高而喘

黃耆(炙) 人參 雲朮(炒各一錢五分) 甘草(炙一錢) 陳皮(五分) 當歸(一錢) 升麻 柴胡(各五分) 右八味加
生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。(東垣之方一概以升提中氣為主如果中氣下陷者最為合度若氣高而喘則非升柴所宜學者不可誤用也)

虎潛丸(丹溪) 治腎陰不足。筋骨痿不能步履
龜板 黃柏(各四兩) 知母 熟地(各三兩) 牛膝(三兩五錢) 鎖陽 虎骨 當歸(各一兩) 芍藥(一兩五錢)
陳皮(七錢五分) 冬月加熟薑(五錢) 右為末。煮羯羊肉搗為丸桐子大。淡鹽湯下。(痿證皆屬於熱經有明文此方最為合度幾人
以溫補治痿則相反矣 痿證又有屬痰濕風寒外邪者此方又非所宜)

資生丸 治婦人妊娠三月。脾虛嘔吐或胎滑不固。兼丈夫調中養胃。飢能使飽。飽能使飢。神妙難述。
人參(三兩) 茯苓(二兩) 雲朮(三兩) 山藥(二兩) 薏仁(一兩半) 蓮肉(二兩) 芡實(一兩半) 甘草(一兩) 陳皮 麥蘖
神麯(各二兩) 砂仁(一兩半) 白豆蔻(八錢) 桔梗(一兩) 藿香(一兩) 川黃連(四錢) 白扁豆 山查(各一兩半) 右十
八味為細末。煉蜜丸彈子大。每服二丸。米飲下。(此方治懷孕氣阻用兼消兼補之法意亦可取今人不論何因為總治脾胃之藥則失製方之義矣 藥味太
雜全無法度姑存之以備一格)

龜鹿二仙膠 大補精髓。益氣養神。
鹿角(血者十斤) 龜板(自敗者五斤) 以上二味另熬膏 枸杞子(甘州者三十兩) 人參(十五兩) 右用鉛罈如法熬膠
初服酒化一錢五分。漸加至三錢。空心下。(精不足者補之以味而龜鹿又能通督任填補之法此為最穩)

三才封髓丹(寶鑑) 除心火。益腎水。滋陰養血。潤補不燥。
天冬 熟地 人參(各五錢) 黃柏(三兩) 砂仁(一兩) 甘草(炙七錢) 右為末。麵糊丸梧子大。每服五十

丸用茯苓半兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下此補陰氣之方虛人老人便結者為宜

七寶美髯丹邵應節 補腎氣烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白雌雄各一斤 牛膝八兩以何首烏先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪甑中一層卻鋪何首烏一層每鋪豆一層卻鋪牛膝一層重重相間上鋪豆覆之以豆熟為度去豆曬乾次日如前用生豆蒸如法蒸七次去豆用 破故紙半斤酒浸洗淨用黑芝麻同炒無聲為度去芝麻 當歸半斤去頭尾酒洗 白茯苓半斤用人乳拌浸透曬乾蒸 赤茯苓半斤黑牛乳浸曬乾蒸 兔絲子半斤酒浸一宿洗曬乾蒸曬三次 枸杞子半斤去蒂枯者 右共為末蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒或米湯白鹽湯皆可下製法不可犯鐵器此補腎血之方

無比山藥丸千金 治丈夫久虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疼腰髖不隨飲食不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行

熟地酒浸 赤石脂 巴戟去心 茯苓 牛膝酒浸 山茱萸肉 澤瀉各三兩 乾山藥二兩 五味子六兩 肉蓯蓉酒浸四兩 兔絲子 杜仲炒各三兩 右藥煉蜜丸桐子大每服二十丸至三十丸食前溫酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響為驗此通中藥入腦鼻必酸疼勿怪此收攝腎氣之方最為穩妥

還少丹楊氏 大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥 牛膝 遠志 山萸肉 茯苓 五味子 楮實子 巴戟酒浸去心 肉蓯蓉酒浸一宿 石菖蒲 杜仲薑汁酒同拌炒 茴香各一兩 枸杞子 熟地各二兩 右共為細末煉蜜同棗肉為丸梧子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服此交通心腎之方

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地 杜仲 兔絲子另研 石斛 黃耆 續斷 肉桂 牛膝 磁石煅醋淬

沉香　五加皮　山藥炒各一兩　右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每服七十丸空心鹽湯送下此降納腎氣之方

羊肉粥方養老書　治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉二斤　黃耆生用一兩　人參二兩　白茯苓一兩　大棗五枚　粳米三合加生薑少許尤佳入核桃去皮亦可　右先以肉去脂皮取精肉留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞並黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟下切生肉更煮入五味調和空心服之此古人服餌之方也

三才丸古潔　治脾肺虛欬嗽

人參　天門冬　地黃各等分　右為末煉蜜丸空心服此方與嗽證非宜必上純虛而不嗽者可用

天王補心丹道藏　治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參　白茯苓　元參　桔梗　遠志各五錢　當歸　五味子　麥冬　天冬　丹參　酸棗仁各一兩　生地四兩　柏子仁一兩　右為末煉蜜丸如椒目大白湯下此養心之主方一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

秘方補心丸　治心虛手振

當歸一兩五錢　川芎　粉甘草各一兩　生地一兩半　遠志二兩半　棗仁炒　柏子仁去油各三兩　人參　膽星　硃砂另研各五錢　金箔二十片　麝香一錢　琥珀三錢　茯苓七錢　石菖蒲六錢　右為末餅糊丸菉豆大硃砂為衣每服七八十丸吐津嚥下或薑湯送下此心神恍惚而有痰者宜之

黑地黃丸　治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮油浸一斤　熟地一斤　五味子半斤　乾薑秋冬一兩夏五錢春七錢　右為末棗肉丸梧子大食前米飲服百丸治

血虛久痔甚妙按此治脫血脾寒之聖藥乾薑當泡淡炒黑用

元精丹　北方黑氣入通於腎開竅於二陰藏精於腎味鹹其類水其病在骨此藥主之

血餘自已髮及父子一本者及小壯男女髮揀去黃白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩搥碎煮水洗淨務期無油氣為佳將髮扯斷曬乾每洗髮一斤用川椒四兩揀去梗核於大鍋內髮一層椒一層和勻以中鍋蓋蓋鹽泥固濟勿令泄氣桑柴火慢煮三炷香即退火待冷取出約重四兩有餘於無風處研為細末　何首烏製法如前七寶美髯丹法取淨末一斤　黑芝麻九蒸九晒取淨末八兩　女貞實四兩　破故紙炒取淨末四兩　生地酒浸杵膏入藥　熟地同上製各八兩　旱蓮草　桑葚各取淨汁熬膏各四兩　胡桃仁二兩研膏　膠棗二兩研膏　槐角子入牛膽內百日四兩　右以藥末和諸膏和勻加煉蜜一斤入石臼杵千餘下為丸梧子大每服六十丸空心用首烏釀酒二三杯送下日三服諸品皆色黑之藥專補腎血此治便後脫血之神方也

青州白丸局方　治一切風及小兒驚風婦人血風大人頭風

南星三兩　白附子二兩　半夏七兩　川烏半兩各生用　右為細末放磁器中日曬夜露春五夏三秋七冬十日以糯米粉煮粥丸薑湯下風證溫酒下驚風薄荷湯下此四味宜水研取漿澄粉曬露七日去水作丸此治風痰之要藥也

指迷茯苓丸　治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

茯苓二兩　半夏一兩　枳殼炒半兩　風化硝二錢半　右為末薑汁和丸桐子大每服三十丸薑湯下按方極和平而義精效速方內半夏宜生研澄粉用

威喜丸局方　治飲食積滯蟲痞脹滿久痢久瘧況冷積塞

廣木香　肉豆蔻各四錢　乾薑炮炒二錢五分　巴豆二十粒去皮心及油炒研　杏仁四十粒去皮尖末細研　百草霜五錢加茯苓亦可　右前四味為末入百草霜同研後入杏仁巴豆霜研黃蠟一兩五錢酒煮一時去酒將蠟入麻油七錢鎔化拌藥研勻乘熱丸如菉豆大每服二三十丸用黃蠟之義最精凡治積新病宜急下久病宜緩下此方治久患寒積之證乃緩下法也

靈砂局方　治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽和五臟助元氣

水銀一斤 硫黃四兩 右二味用新鐵銚炒成砂子。或有烟焰即以醋灑。候研細入水火鼎。醋調赤石脂封口。鐵線扎縛。曬乾。鹽泥固濟。用炭二十斤煅。如鼎子裂。筆蘸赤石脂頻抹其處。火盡為度。經宿取出。研為細末。糯米糊為丸。如麻子大。每服三丸。空心棗湯米飲井花水人參湯任下。量病輕重。增至五七丸。此鎮墜之藥。若用黑錫丹則此方可不備。

二神丸本事 治腰痛腎虛。全不進食。

破故紙四兩炒 肉豆蔻二兩生 右為末。用大棗四十枚。生薑四兩。同煎爛。去薑棗核皮。研膏入藥末丸。鹽湯下。此治腎家有寒濕之方。本方加五味子吳茱萸各二兩。為四神丸。

導赤散錢氏 治心熱口糜舌瘡。小便黃赤。莖中作痛。熱淋不利。

生地 木通 甘草梢各等分 右三味水煎服。此瀉心火從小腸中出也。

亡血脫血方千金翼 治亡血脫血。鼻頭白色。唇白去血無力者。

生地黃十斤 右一味擣。以酒一斗絞取汁。令極盡去渣。微火煎減半。納白蜜五升。棗膏一升。以攪之勿止。令可丸。酒服如雞子一丸。日三。久服不已。老而更少。萬病除愈。千金又以此二味加阿膠甘草作煎服。亦可用。

當歸補血湯寶鑑 治男婦血虛。似白虎證。肌熱面赤。煩渴引飲。脈來洪大而虛。重按則微。

當歸二錢 黃耆一兩 右二味水煎服。此補表血之方。

益血潤腸丸 治津液亡。大腸秘。老人虛人皆可服。並祛風養血。

熟地六兩 杏仁炒 麻仁各三兩以上三味俱擣膏 枳殼 當歸 橘紅淨各二兩五錢 阿膠 肉蓯蓉各一兩半 蘇子 荊芥各一兩 右為末。以前三味膏同杵千餘下。仍加蜜丸梧子大。每服五六十丸。空心白

湯下。此脾約丸之變法

芎當膠艾湯金匱　婦人有漏下者。有半產後因續下血不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。

芎藭　阿膠　甘草各二兩　艾葉　當歸各三兩　芍藥四兩　乾地黃六兩　右六味。水五升。清酒三升。合煮取三升。去滓納膠。令消盡。溫服一升。日三服。不瘥更作。

四物湯局方　治一切血熱血虛血燥諸證

當歸　熟地各三錢　川芎一錢五分　白芍二錢酒炒　右四味。水煎服。此血病之主方

八珍湯　治心肺虛損。氣血兩虛。　即四君子湯合四物湯。餘依上法。

十全大補湯局方　治男子婦人。諸虛不足。五勞七傷。不進飲食。久病虛損。時發潮熱。氣攻骨脊。拘急疼痛。夜夢遺精。面色痿黃。腳膝無力。　即八珍湯加桂心陳皮。

人參養榮湯局方　治脾肺俱虛。發熱惡寒。肢體瘦倦。食少作瀉。

人參　白朮　茯苓　甘草　黃耆　陳皮　當歸各一錢　熟地七分半　白芍一錢半　桂心一錢　遠志五分　五味子七分半　右十二味。加薑三片。大棗二枚。此即十全大補湯去川芎加五味遠志黃耆以生心血

柴胡四物湯保命　治日久虛勞。微有寒熱。脈沉而數。

川芎　當歸　白芍　熟地各一錢五分當用生地　柴胡一錢　人參　黃耆　甘草　半夏各三錢　右為末。水煎服。柴胡加入補藥俱不相合獨此為宜柴胡疎通少陽調和榮衛非專於散風也

兔絲子丸和劑　治腎氣虛損。五勞七傷。腳膝痠疼。面目黧黑。目眩耳鳴。心衝氣短。時有盜汗。小便數滑。

兔絲子　鹿茸酥炙去毛　澤瀉　石龍芮去土淨再用水洗　桂枝　附子各一兩　石斛　熟地　茯苓

牛膝（酒浸焙） 山萸肉 續斷 防風 杜仲 肉蓯蓉（酒浸焙） 補骨脂（酒炒） 蓽澄茄 巴戟
沉香 茴香（炒各七錢五分） 五味子 川芎 桑螵蛸（酒浸炒） 覆盆子（各五錢） 右為細末酒煮麵糊為
丸梧子大每服三十丸溫酒下或鹽湯下（此等方不過陰陽兼補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不雜尚屬可取）

蓯蓉菟絲子丸 此方不寒不熱助陰生子

肉蓯蓉（一兩三錢） 覆盆子 蛇床子 川芎 當歸 菟絲子（各一兩二錢） 白芍（一兩） 牡蠣（鹽泥固煅）
烏鰂魚骨（各八錢） 五味子 防風（各六錢） 艾葉（三錢） 條芩（五錢） 右為末煉蜜丸如梧子大每服三四
十丸鹽湯下早晚皆可服（此乃婦人溫經之主方也）

餌朮方（千金翼） 生朮削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之
勿傳（真於朮尤佳此服食之方也）

服牛乳方（千金翼） 能補虛破氣

牛乳（三升） 蓽撥（半兩末之綿裹） 右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

生地黃煎（外臺） 主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地汁（五升） 棗膏（六合） 白蜜（七合） 酒（一升） 牛酥（四合） 生薑汁（二合） 紫蘇子（一升以酒一升絞取汁） 鹿角膠（四兩炙末）
右煎地黃等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

阿伽陀藥（千金翼） 主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方（此等即所謂海上奇方如紫金錠之類其所治之證皆與本草不相合而
確有神驗真不可思議也）

紫檀（用蘇木亦可） 小蘗（一名山石榴） 茜草 鬱金 胡椒（各五兩） 右為末水和納臼中更擣一萬杵丸好
陰乾用 諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯

服一丸諸四體酸疼或寒或熱麻黃湯一丸諸䘌下部有瘡吞一丸又煮艾槐白皮湯研一丸灌下部諸卒死冷水服二丸諸被厭禱當心帶一丸又水研一丸三服諸被蛇及惡獸等毒以麝香如相思子研藥一丸服並以紫檀磨汁和藥塗患處諸被鬼撓亂失心癲狂艾汁下如無青艾乾艾取汁亦可并隨身帶一丸諸傳尸水磨雄黃下諸消渴朴硝湯下諸淋水服二丸諸疔腫元參湯下諸卒胸膈熱苦竹葉湯下諸難產以豬胰二七水煮服一丸薑黃亦得諸熱瘡大黃取汁服又以大黃和藥調塗諸吐血若因熱吐者服之並瘥因冷吐者菖蒲汁下諸鼻中血刺薊汁下並研灌鼻諸噎病括蔞汁下諸赤白帶下以丹皮刺薊根各二分煮服　後補法　以地榆桑螵蛸(一云桑耳)各二分水二升煮取一升分作二服取汁一合研藥一二丸服之諸藥毒惡忤研服惡瘧恒山湯下瘟疫時氣元參湯下諸蠱瘡濕及心風心驚戰悸多忘恍惚嘔吐黃疸失音風癇臍下絞痛霍亂吐痢小兒驚啼產後血結並宜服之

玉屏風散(得效)

治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風　黃耆　白朮(各等分或加炒糯米)　右為細末酒調服(服此能固表使風邪不易入加牡蠣名白朮散)

盜汗方(外臺)

麻黃根　牡蠣(各三錢)　黃耆　人參(各三兩)　龍骨　枸杞根　白皮(各四兩)　大棗(七枚)　右以水六升煮取二升五合分六服

止汗紅粉

麻黃根　牡蠣(煅各一兩)　赤石脂　龍骨(各五錢)　右為末以絹袋盛貯如扑粉用之

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱

當歸　生地　熟地　黃芩　黃連　黃柏(等分)　黃耆(加倍)　右水煎服(凡止汗方內俱可加浮麥大棗)

麥門冬湯（直三） 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慓悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有是證

麥冬 生蘆根 竹茹 白朮（各五錢） 甘草（炙） 茯苓（各二兩） 人參 陳皮 葳蕤（各三兩）

右九味每服四錢薑五片陳米一撮煎熱服（不論冬夏頭汗自出謂之漏風俗名蒸籠頭）

二賢散 治積塊進飲食

橘紅（一斤） 甘草（四兩） 鹽（五錢） 右以水煮爛曬乾為末淡鹽湯下有塊加薑黃半兩同前藥煮氣滯加香附二兩氣虛加沉香半兩另入噤口痢加蓮肉二兩

逍遙散（局方） 治肝家血虛火旺頭痛目眩頰赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂兩脇作痛寒熱小腹重墜婦人經水不調脈弦大而虛

芍藥（酒炒） 當歸 白朮（炒） 茯苓 甘草（炙） 柴胡（各二錢） 本方加丹皮梔子即加味逍遙散

加煨薑三片薄荷少許煎服（此疏通肝脾之方）

平胃散（局方） 治濕淫於內脾胃不能剋制有積飲痞膈中滿者

蒼朮（五斤米泔浸七日） 陳皮（去白） 厚朴（各三斤薑汁炒） 甘草（三十兩炙） 右為末每服二錢薑湯下日三服或水煎每服五錢 如小便赤澀加茯苓澤瀉米穀不化飲食傷多加枳殼胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半遇夏加炒黃芩遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮欬嗽飲食減少脈細加當歸黃耆脈洪大緩加黃芩黃連大便硬加大黃三錢芒硝三錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下本方加皂礬即皂礬平胃丸（消食積蟲痞）

五苓散（金匱） 治瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也此方主之（此乃散方近人用以作湯往往鮮效）

澤瀉一兩一分　猪苓去皮　白朮　茯苓各三分　桂二分去皮　右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈傷寒論以此方治太陽表裏未清之症所謂表裏者經與府也故此方為利膀胱水道之主藥

二陳湯局方　治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿

半夏製　茯苓各三錢　陳皮二錢去白　甘草一錢　右四味加薑三片水煎服

枳朮丸　治痞積消食強胃金匱名枳朮湯治心中堅大如盤

枳實一兩　白朮二兩　右用荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸加木香砂仁即香砂枳朮丸本方

金匱張懷古變其法成丸

瀉黃散　治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴

藿香七錢　山梔一兩　甘草二兩　防風四兩　右四味同蜜酒炒為末每二錢煎服其妙在用蜜酒炒

保和丸丹溪　治食積酒積

山查二兩　半夏薑製　橘紅　神麯　麥芽　茯苓各一兩　連翹　萊菔子炒　黃連各半兩

右為末水丸加白朮二兩名大安丸此治脾胃濕火氣阻之方

加減思食丸　治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹脇時脹食減嗜臥口苦無味虛羸少氣胸中有寒飲

食不下反胃惡心及病後心虛不勝穀氣食不服常並宜服之

神麯炒黃　麥芽炒黃各二兩　烏梅四兩　乾木瓜半兩　白茯苓　甘草炒各二錢半　右為末蜜丸櫻桃大每

服一丸細嚼白湯送下如渴時噙化一丸此收納胃氣之方用烏梅木瓜甚巧

越鞠湯丸丹溪　治一切濕痰食火氣血諸鬱

香附　蒼朮　撫芎各二兩　神麯　山梔仁各一兩　右以水煎服或作丸菉豆大每服百丸白

滾湯下

四磨飲生濟 治七情傷感上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥 右四味各濃磨水取七分煎三五沸空心溫服濃汁使藥存留胸中不即下達亦古製方之法也

妙香丸局方 治時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚癇百病

巴豆三百十五粒去殼心膜炒熟研如麪按巴豆太多宜酌減 牛黃研 龍腦研 膩粉 麝香各研三兩 辰砂研飛九兩 金箔研九十片

右合研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通大黃炙甘草湯下一丸毒痢下血黃連湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等證並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菉豆大二丸諸積食積煩赤煩躁睡臥不寧驚哭瀉痢並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如男婦因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發經七八日至半月日未安醫所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並用龍腦膩粉米飲調下一服取轉下一切惡毒涎並藥丸瀉下如要藥即行用鍼刺一孔冷水浸少時服之其效更速凡用蠟丸之藥既不可化開服則三分一丸之大丸不能下嚥宜作一分一丸之小丸每服三丸為安

藿香正氣散局方 治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二兩 甘草一兩炙 大腹皮換檳榔亦可 白芷 茯苓 蘇葉各三兩

藿香三兩 右十味加薑棗水煎熱服此方可治時疫

天水散河間一名益元散一名六一散 治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能催生

下乳積聚水蓄裏急後重暑注下迫者宜之

桂府滑石六兩水飛 甘草一兩 辰砂三錢 右為細末新汲水一碗調服三錢 滑利清涼通達水道而不傷陰所以為佳

二氣丹局方 治內虛裏寒胸腹滿痛泄利無度嘔吐自汗小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰症霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

肉桂 硫黃細研各二錢半 乾薑泡 硃砂另研為衣各二錢 黑附子製五錢 右為末麪糊丸桐子大每服三十丸艾湯或鹽湯下 此治下焦無陽積寒犯腎之症

瀉白散錢乙 治肺熱咳嗽

桑皮炒 地骨皮各一兩 甘草五錢 右為末每服一二錢入粳米百粒水煎 此方能治肺中之欬

三黃湯本事 治三焦實熱一切有餘火症大便秘結者

黃芩 大黃 黃連各等分 右三味水煎服

涼膈散局方 治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風瘛瘲發斑發狂及小兒驚風痘瘡黑陷

連翹四兩 大黃酒浸 芒硝 甘草各二兩 黃芩酒炒 薄荷 梔子各一兩 右為末每服三錢加竹葉生蜜煎 此瀉中上二焦之火即調胃承氣加疎風清火之品也

四物二連湯元戎 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸 白芍炒 生地各一兩 川芎七分 黃連炒五分 胡黃連三分 右六味水煎服 血中有實熱此方主之

左金丸 治肝藏火實左脇作痛

黃連六兩 吳茱萸洗泡一兩 右為末作丸 吳萸仲景用以治嘔逆吐涎等證脇痛亦痰飲為害也兩脇皆屬於肝此方亦不專治左脇

龍膽瀉肝湯方局 治脇痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血

龍膽酒炒三分 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉一錢 木通 車前子各五分 當歸二分酒洗炒 柴胡一錢 甘草

生地酒炒各三分 右十味水煎服此瀉中上焦之火純用苦味

甘露飲方局 治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目垂欲閉饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疹已發未發又療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之

枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地 麥冬 石斛 甘草炙

黃芩各等分 右為末每二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服本事方去麥冬加犀角名加減甘露飲此乃以散作飲者

清心蓮子飲方局 治心虛有熱小便赤澀

黃芩 麥門冬去心 地骨皮 甘草炙 車前子各半兩 石蓮肉去心 白茯苓去皮 黃耆蜜炙

人參各七錢半 右剉散每三錢另用麥冬十粒水煎八分水中沉冷空心服發熱加柴胡薄荷亦以散作飲者

瀉熱梔子煎外臺 治膽府實熱精神不守

梔子二十一枚 竹茹一兩 香豉六合 大青 橘皮各二兩 赤蜜三合 右六味以水六升煮取一升七合去滓下蜜再微煎二三沸分再服

大順散方局 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草三十斤剉寸長 乾薑 杏仁去皮尖 肉桂去粗皮各四斤 右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度篩淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯調亦得此治暑天內傷冷飲之症非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一偶用之耳而製藥四十二斤又止服二錢其

意何居其方本不足取而後之庸醫竟以此治燥火之暑病殺人無算故錄此以證其非

十精丸 又名保真丸元和紀用經

兔絲子 人精長陰發陽酒浸一宿濕搗 甘菊花 月精二味春加一倍 五加皮 草精益肌去皮用 柏子仁 木精明目通氣二味夏加 白朮 日精長肌肉 人參 藥精鎮心療驚癎二味秋加 石斛 山精治筋骨如金釵者酥炙 鹿茸 血精止腰痛益精酥炙 肉蓯蓉 地精破癥消食酒浸一宿蒸用 巴戟 天精治精冷益智紫色者去心酒浸一宿四味冬加

右十味等分隨四季各加分兩為末煉蜜丸梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十五粒至三十粒忌羊肉生葱 此世所謂丹藥也溫平補益

成煉鍾乳粉 千金翼

主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛療脚弱冷疼下焦傷竭強陰久服延年益壽令人有子

鍾乳不拘多少

右取韶州鍾乳顏色明淨光澤者不拘多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺著水沉金銀器於鐺中煑之常令如魚眼沸水減即添薄乳三日三夜粗厚管者七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煑滿十日最佳出金銀器中更著清水更煑經半日許即出之水色清不變則止即於磁鉢中用玉鎚著水研之每日著水攪令勻勿使著鎚鉢勿使纖塵入內研覺乾濇即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復繞鎚鉢四邊研之狀若乳汁研指上如書中白魚膩即成澄取曝乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服更量病輕重加減服之亦可和為丸服之 此鎮心強腎之聖藥唐人最重之

玉霜圓 局方

治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精二便滑數肌消陽痿久服續骨聯筋祕精堅髓安魂定魄輕身壯陽

白龍骨 一斤細搗羅研水飛三次曬乾用黑豆一斗蒸一伏時以夾袋盛曬乾 牡蠣 火煆成粉 紫稍花 如無以木賊代之各三兩 牛膝 酒浸炙乾秤 磁石 醋淬七次

紫巴戟穿心者 澤瀉酒浸一宿炙 石斛炙 硃砂研飛 肉蓯蓉去皮酒浸一宿炙乾各二兩 茴香微炒 肉桂去皮各一兩 兎絲
子酒浸一伏時蒸杵為末 鹿茸半兩酒浸一伏時慢火炙脆 韭子微炒五兩 天雄十兩酒浸七日掘一地坑以炭燒赤速去火令淨以醋二升沃於坑候乾乘熱便投天雄在內
以盆合土擁之經宿後取出去皮臍 右為細末煉酒蜜各半和丸如桐子大每服三十丸空心晚食前溫酒下。按此藥溫
精納氣腎中陽虛者最宜亦丹藥也

礞石滚痰丸養生主論 治實熱老痰之峻劑。虛寒者不可用。
黄芩 大黄酒蒸各八兩 礞石一兩焰消煅過埋地內七日 沉香忌火五錢 右四味為細末水丸川椒大。量人大小用
之。用溫水一口。送過咽即仰臥。令藥徐徐而下。半日不可飲食。勿起身行動言語。待藥氣自胃口漸下
二腸。然後動作飲食。服後喉間稠黏壅滯不快。此藥力相攻。故痰氣從上也。少頃藥力至而漸逐惡物
入腹下腸。效如響應。下結痰之主方

黑錫丹局 治脾元久冷。上實下虛。胸中痰飲。或上攻頭目。及奔豚上氣。兩脅膨脹。並陰陽氣不升降。五
種水氣。脚氣上攻。或卒暴中風。痰潮上膈等症
沉香 附子 胡蘆巴 肉桂各半兩 茴香 破故紙 肉豆蔻 金鈴子
木香各一兩 黑錫 硫黄與黑錫結砂子各三兩 右為末。同研。酒煮麵糊為丸梧子大。陰乾。以布袋擦令光
瑩。每服四十丸。薑湯下。此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥 按黑錫成砂最難加水銀少許為妙

龍腦雞蘇丸局 治上焦熱。除煩解勞。去肺熱咳衄。血熱驚悸。脾胃熱口甘吐血。肝膽熱泣出口苦。腎熱
神志不定。上而酒毒膈熱消渴。下而血滯五淋血崩
薄荷一斤 生地另為末六兩 黄芩 新蒲黄炒 麥冬 阿膠炒 人參俱為末 木通 銀柴胡各二兩木
通沸湯浸一日夜絞汁 甘草半兩 黄連一兩 右為末。好蜜二斤。先煎一二沸。然後下生地末。不住手攪。時加

木通柴胡汁。慢火熬膏。勿令火緊。膏成。然後加藥末和丸。豌豆大。每服二十丸。白湯下。此方製法精妙 虛勞虛煩梔子湯下。肺熱黃芩湯下。心熱悸動恍惚人參湯下。衄血吐血麥冬湯下。肝熱防風湯下。腎熱黃柏湯下。以上並食後臨臥服。治五淋及婦人漏下。車前湯下。痰嗽者。生薑湯下。莖中痛者。蒲黃滑石水一鍾調下。氣逆。橘皮湯下。室女虛勞。寒熱潮作。柴胡人參湯下。按生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤妙此方能治血中之熱骨蒸病最宜惟薄荷太多宜減十分之九想製方之人所用薄荷乃他處之薄荷非蘇州之眞龍腦也眞龍腦芳烈透腦發洩太過反有所害故醫者不可不知藥也

至寶丹方局　治中惡氣絕。中風不語。中諸物毒。熱疫煩躁。氣喘吐逆。難產悶亂。死胎不下。以上並用童便一合。生薑自然汁三五滴。和溫化下三丸至五丸。神效。又治肝肺積熱。嘔吐。邪氣攻心。大腸風秘。神魂恍惚。頭目昏眩。口乾不眠。傷寒狂語。並治之。

生烏犀屑　生玳瑁屑　琥珀研　硃砂研飛　雄黃研細各一兩　龍腦　麝香研各一分　牛黃五錢研

安息香一兩半為末酒研飛淨一兩熬膏用水安息尤妙　銀箔　金箔各五十片研細為衣　右將生犀玳瑁為細末。入餘藥研勻。將安息香膏重湯煮凝成後。入諸藥中。和擣成劑。丸如桐子大。用人參湯化下三丸至五丸。又治小兒諸癇急驚。心熱。卒中客忤。不得眠。煩躁。風涎搐搦。每三歲兒服三丸。人參湯下。本事方中。多人參南星天竺黃。安神定魄必備之方眞神丹也

蘇合香丸方局　療傳屍骨蒸。殗殜肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴瘧。赤白暴痢。瘀血月閉。痃癖丁腫。驚癇。小兒吐乳。大人狐狸等疾。

蘇合香油五錢入安息香內　安息香一兩另為末用無灰酒半斤熬膏　丁香　青木香　白檀香　沉香　蓽撥　香附子　訶子煨取肉　烏犀鎊　硃砂水飛各一兩　薰陸香　片腦研各五錢　麝香七錢半　右為細末。入安息香膏。煉蜜和劑。丸如芡實大。每四丸。空心用沸湯化下。溫酒下亦得。此辟邪驅穢之聖方惟冰麝太多宜減大半

瓊玉膏申先生方 治虛勞乾欬

生地黃四斤若取鮮生地汁須用十斤 白茯苓十二兩 白蜜二斤 人參六兩有加沉香血珀粉各一錢五分 右以地黃汁同蜜熬沸用絹濾過將參苓為細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮三晝夜取出換紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調服此方別本製法各殊此為血證第一方按乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地則十斤祇取自然汁一斤須三十斤方可配諸藥故修合之法當隨時隨地變通也

大活絡丹聖濟 治一切中風癱瘓痿痺痰厥拘攣疼痛癰疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白花蛇 烏稍蛇 威靈仙 兩頭尖俱酒浸 草烏 天麻煨 全蝎去毒 首烏黑豆水浸

龜板炙 麻黃 貫仲 炙草 羌活 官桂 藿香 烏藥 黃連 熟地

大黃蒸 木香 沉香以上各二兩 細辛 赤芍 沒藥去油另研 丁香 乳香去油另研 殭蠶

天南星薑製 青皮 骨碎補 白蔻 安息香酒熬 黑附子製 黃芩蒸 茯苓

香附酒浸焙 元參 白朮以上各一兩 防風二兩半 葛根 虎脛骨炙 當歸各一兩半 血竭七錢另研

地龍炙 犀角 麝香另研 松脂各五錢 牛黃另研 片腦另研各一錢五分 人參三兩 右共五十味為末蜜丸如桂圓核大金箔為衣陳酒送下頑痰惡風熱毒瘀血入於經絡非此方不能透達凡治肢體大證必備之藥也方書亦有活絡丹祇用地龍乳香等四五味此乃治藜藿人實邪之方不堪用也

紫雪局方 療腳氣口中生瘡狂易叫走瘴疫毒厲卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾㽲痛及解諸熱毒藥邪熱卒黃等症并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩 寒水石 磁石 石膏 滑石各三斤 以上並搗碎用水一斛煮至四斗去滓入下藥 羚羊角屑 犀角屑 青木香 沉香各五斤 丁香一兩 元參 升麻各一斤

甘草八兩炙 以上入前藥汁中。再煮取一斗五升。去渣入下藥。 朴硝十斤 硝石四斤 二味入前藥汁中。微火上煎。柳木篦攪不住手。候有七升。投在木盆中。半日欲凝入下藥 麝香當門子一兩二錢半 硃砂三兩 上藥入前藥中。攪調令勻。磁器收藏。藥成霜雪紫色。水調下。一按二硝太多當只用十分之一則藥力方厚丁香用二兩

余所合者皆照方中黃金百兩以飛金一萬頁代之尤妙 抑火毒火穿經入臟無藥可治此能消解其效如神

解毒萬病丹一名紫金錠 治一切藥毒。菰子鼠莽惡菌疫死牛馬河豚等毒及時行瘟疫。山嵐瘴瘧。纏喉風痺黃疸赤眼瘡癤熱毒上攻或自縊溺水。打撲傷損癰疽發背魚臍瘡腫百蟲蛇犬所傷男子婦人癲邪狂走。鬼胎鬼氣。並宜服之。

山茨菰去皮洗淨焙二兩 川文蛤一名五棓子槌破洗刮內桴二兩 千金子去殼用紙包裹換紙研數十次去盡油無油成霜二兩 麝香細研盡三錢 紅芽大戟洗焙一兩 右各研細末和勻。以糯米粥為劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合。如欲急用辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服人。不具手足人。及雞犬之類見之。此秘藥中之第一方也。用藥之奇不可思議。或入加硃砂雄黃各五錢尤效

